



GERENA

Innovacion estetica a tu alcance

LOCAL ANESTHETIC

JADE caine cream

JADE caine plus⁺ cream





Lidocaine 10.56%

GERENA

Innovacion estetica a tu alcance

JADE caine cream

Crema anestésica hipoalérgica con alto contenido en lidocaína.



Especificaciones 500g / Tarro

Almacenamiento Guardar debidamente en su contenedor a una temperatura (1-30°C)

Duracion 36 meses a su fecha de fabricacion

Ingredientes / Cantidad Por 1g

- Ingrediente Activo: Lidocaina.....105.6mg
- Aditivo/Preservativo: Paraoxibenzoato de metilo..... 1.0mg
- Otros Activos: Stearyl alcohol, isopropyl myristate, purified water, carbomer940, trolamine, polysorbate60, ethanol

Apariencia Crema blanca

Indicaciones Anestesia local tópica

Dosis y administracion Aplica 0.25-0.66g (26.4-69.7 de lidocaina) en la zona por un periodo de 5 a 15 minutos en un procedimiento para adultos. No exceda 1.74g (184mg de lidocaina) en 24 horas.

Precauciones de uso

- 1.No administrar en los siguientes pacientes: 1) Pacientes con con hipersensibilidad a este medicamento u otros anestésicos locales. 2) No aplique sobre heridas o areas infectadas. 3) No se use en pacientes embarazadas.
- 2.Precaución administrando a los siguientes pacientes: 1) Pacientes con enfermedad renal o hepatica.
- 3.Precauciones Generales: 1) Detenga el uso y consulte a su medico si muestra signos de erupción o irritación. 2) No exceda los tres meses de aplicacion sin la supervicion de un medico.
4. Aplicacion: 1) Para uso externo solamente. No aplicar en ojos y nariz 2) Evite aplicar varias capas sobre la misma area.
- 5.Precaucion de almacenamiento y manipulacion: 1) Mantener fuera del alcance de bebes y niños. 2) Mantener alejado de luz solar o luz directa.

LOCAL ANESTHETIC JADE caine cream



Lidocaine 25mg / Prilocaine 25mg

GERENA

Innovacion estetica a tu alcance

JADE caine plus⁺ cream

Crema anestésica local con un efecto mas fuerte



Especificaciones	500g / Tarro
Almacenamiento	Guardar debidamente en su contenedor a una temperatura (1-30°C)
Duracion	36 meses a su fecha de fabricacion
Ingredientes / Cantidad Por 1g	<ul style="list-style-type: none">· Ingrediente Activo: Lidocaina.....25.0mg Procaina.....25.0mg· Aditivo/Preservativo: Paraoxibenzoato de metilo..... 1.0mg· Otros Activos: Glycerin Monostearate, N-Methylpyrrolidone, Liquid Paraffin, Isopropyl Myristate, Purified Water, Carbomer 940, Polysorbate 60, Propylene Glycol
Apariencia	Crema blanca
Indicaciones	<ol style="list-style-type: none">1. Anestesia superficial de la piel durante la insercion de agujas o procedimientos quirurgicos.2. Anestesia de la mucosa genital (antes de la extirpación del condiloma)3. Anestesia superficial de úlceras en las piernas antes de la irrigación o cirugía tópica. (Eliminación de fibrina, pus o tejido subcutáneo)
Dosis y administracion	Rara vez se ha informado de metahemoglobinemia clínicamente significativa en niños. Las dosis altas de prilocaína pueden aumentar la metahemoglobina; en bebés de 3 meses, 125 mg de prilocaína, cuando se aplicaron tópicamente durante 5 horas, provocaron metahemoglobinemia moderada. La lidocaína a dosis de 8,6 a 17,2 mg/kg provocó una intoxicación grave en los bebés.
Precauciones de uso	<ol style="list-style-type: none">1. No aplique este medicamento alrededor de los ojos ya que puede causar irritación de la córnea. Si este medicamento entra en contacto con los ojos, estos deben enjuagarse con agua o una solución de cloruro de sodio y protegerse hasta que vuelva el entumecimiento.2. Al igual que otros anestésicos locales, este medicamento puede ser tóxico para el oído y no debe aplicarse en el oído medio, ni tampoco debe usarse para procedimientos o paracentesis que puedan penetrar el oído medio.3. No aplica sobre erosiones abiertas.



GERENA

Innovacion estetica a tu alcance



GERENA
Innovacion estetica a tu alcance



Gerena Insumos Medicos



@Gerena.insumosmedicos