

JADE

caine plus+

Crema Anestésica de uso Externo
Fórmula a base de lidocaína y prilocaína para
anestesia pre-procedimiento



Lidocaine 25mg / Prilocaine 25mg

Crema anestésica local con efecto intenso

Especificaciones 500g / Tarro

Almacenamiento Guardar debidamente en su contenedor a una temperatura (1-30°C)

Duración 36 meses a su fecha de fabricación

**Ingredientes /
Cantidad
Por 1g**

- Ingrediente Activo: Lidocaina.....25.0mg
Procaina.....25.0mg
- Aditivo/Conservante: Paraoxibenzoato de metilo.... 1.0mg
- Otros Activos: Glycerin Monostearate, N-Methylpyrrolidone, Parafina Líquida, Isopropyl Myristate, Aqua, Carbomer 940, Polysorbato 60, Propylene Glycol

Apariencia Crema blanca

Indicaciones

1. Anestesia superficial de la piel durante la inserción de agujas o procedimientos quirúrgicos.
2. Anestesia de la mucosa genital (antes de la extirpación del condiloma)
3. Anestesia superficial de úlceras en las piernas antes de la irrigación o cirugía tópica.
(Eliminación de fibrina, pus o tejido subcutáneo)

**Dosis y
Precauciones**

Rara vez se ha informado de metahemoglobinemia, clínicamente significativa en niños. Las dosis altas de prilocaína pueden aumentar la metahemoglobina; en bebés de 3 meses. Cuando se aplicaron 125 mg de prilocaína tópicamente durante 5 horas, provocaron metahemoglobinemia moderada. La lidocaína a dosis de 8,6 a 17,2 mg/kg provocó una intoxicación grave en los bebés.



 Guadalajara, Jalisco, México.

 [grupogerena.mx](https://www.instagram.com/grupogerena.mx)

 www.grupogerena.com.mx