

Dysport®

Toxina botulínica de alta calidad

 **GERENA**

Dysport es una toxina botulínica de alta calidad, utilizada para inyección subcutánea o intramuscular bajo prescripción médica. Se utiliza para el tratamiento de diversas condiciones médicas y estéticas. Es ampliamente utilizado en neurología y oftalmología para tratar espasticidad, distonía y otras condiciones relacionadas con la contracción muscular excesiva.

Paquete	Contenido
1 caja	1 vial de polvo liofilizado de 3 ml con 500 U
Fórmula	

- Solución de albúmina 20% - 125 mcg
- Lactosa - 2.5 mcg
- Complejo hemaglutinina-toxina Clostridium botulinum tipo A - 500 U




Reconstruction

Método de administración en el caso de líneas de expresión moderadas a severas. DYSPOORT 500 U se realiza con 2.50 ml de cloruro de sodio al 0.9% (sin conservadores) para obtener una solución que contiene 200 U/ml de toxina botulínica tipo A.

Almacenamiento

- Vida útil en el estante, de producto empacado y sin abrir, es de **18 meses a temperatura de 2-8 °C**.
- El producto puede ser almacenado hasta 8 horas a temperatura de 2-8 °C después de la reconstrucción, cuando esta se realizó en condiciones controladas y bajo una técnica aséptica.
- Debido a que el producto no contiene agentes antimicrobianos ni conservadores, el producto reconstruido debe ser utilizado lo más pronto posible después de la reconstrucción.
- DYSPOORT no debe ser congelado.



Manejo de la sobredosificación o ingesta accidental

El exceso de dosis puede producir una parálisis neuromuscular distante y profunda. La sobredosis puede llevar a un incremento en el riesgo de que la neurotoxina ingrese al torrente sanguíneo y quizá cause complicaciones asociadas con los efectos de envenenamiento vía oral por toxina botulínica (por ejemplo: disfagia y disfonía). En aquellos casos en que un exceso de dosis cause la parálisis de los músculos respiratorios, puede ser necesaria la respiración asistida.

No existe un antídoto específico, no hay efectos benéficos de ninguna antitoxina y se recomiendan cuidados especiales. En caso de una sobredosis, el paciente debe ser monitorizado por personal médico en busca de signos y/o síntomas de debilidad muscular significativa o parálisis muscular. Debe administrarse tratamiento sintomático en caso de ser necesario.

Los síntomas relacionados con la sobredosis pueden no presentarse inmediatamente después de la inyección. En caso de que ocurra una inyección o ingesta oral accidental, el paciente debe ser supervisado inmediatamente y durante varias semanas por personal médico, en busca de signos y/o síntomas de debilidad muscular significativa o parálisis muscular.

Precauciones especiales para su desecho

Inmediatamente después de tratar al paciente, todo residuo de DYSPORT que pudiera quedar en el vial o la jeringa debe ser inactivado mediante solución diluida de hipoclorito (1% de cloro disponible).

Eliminar todo el material utilizado, según las prácticas hospitalarias estándar. Cualquier cantidad derramada de DYSPORT debe ser enjuagada con un trapo absorbente empapado en solución diluida de hipoclorito.





 Guadalajara, Jalisco, México.

 [grupogerena.mx](https://www.instagram.com/grupogerena.mx)

 www.grupogerena.com.mx